


INTERNISTISCHE PRAXISGEMEINSCHAFT

Gastroenterologie Pneumologie

Bei Ihnen ist eine Darmspiegelung in unserer Praxis geplant. Damit diese Untersuchung komplikationslos und aussagekräftig durchgeführt werden kann, sind im Vorfeld einige Punkte zu beachten.

Bitte lesen Sie dieses Blatt daher sorgfältig durch und befolgen Sie ebenso sorgfältig die Anweisungen zur Vorbereitung!



Internistische Praxis

Dr. med.
H.U. PREISENDÖRFER
H.-J. W. LANGE
Fachärzte für
Innere Medizin

Dr. med. M. BOLCZEK
Facharzt für
Innere Medizin
- Gastroenterologe

Dr. med. B. FUNK
Facharzt für
Innere Medizin
- Gastroenterologe
- Ernährungsmediziner
(DGVS)

Dr. med.
F. FREYTAG
FACHARZT FÜR
INNERE MEDIZIN
- PNEUMOLOGE -

ROBERT-KOCH-STR. 7
63263 NEU-ISENBURG

TEL 06102 – 6966
FAX 06102 – 5605656
www.ipg-neu-isenburg.de



Blutentnahme:

Lassen Sie einige Tage vor der Untersuchung bei uns ein **kleines Blutbild** anfertigen sowie den **Quick- bzw. INR-Wert** bestimmen. In Absprache mit Ihrem Hausarzt kann auch dieser das übernehmen.

Blutverdünnende Medikamente

Medikamente, welche die Blutgerinnung beeinflussen wie ASS (z.B. **Aspirin® /ASS 100®**) bzw. Clopidogrel (**Iscover®/Plavix®**) sollten Sie **in Abstimmung** mit dem Hausarzt 5 Tage vor der geplanten Darmspiegelung absetzen.

Falls Sie **Marcumar®, Warafin®, Xarelto®, Pradaxa®, Lixiana®, Eliquis®** oder **Brilique®** einnehmen, besprechen Sie das erforderliche Vorgehen **bitte** mit Ihrem Hausarzt oder wenden sich an uns

- der **Quick - Wert** sollte zur Untersuchung mindestens 50 % betragen (das entspricht einem **INR** von höchstens 1,5)

Medikamente für Diabetiker

Wenn Sie Diabetiker sind und blutzuckersenkende Medikamente einnehmen oder Insulin spritzen, besprechen Sie bitte das genaue Vorgehen unbedingt mit Ihrem behandelnden Arzt oder einem unserer Ärzte.

Nach der Untersuchung:

Am Untersuchungstag dürfen Sie nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen (Auto, Fahrrad...) und keine Maschinen betätigen.
Für den nächsten Tag gilt die Absprache mit dem behandelnden Arzt.

Bitte bringen Sie aus diesem Grund wenn möglich eine Begleitperson mit!
Auch öffentliche Verkehrsmittel sollen Sie am Untersuchungstag nicht ohne Begleitung benutzen. Ihre Fahrtüchtigkeit bleibt den ganzen Untersuchungstag eingeschränkt!

Terminabsage:

Termine, die nicht 24 Stunden vor der Untersuchung abgesagt werden, müssen wir Ihnen in Rechnung stellen.
Wir danken Ihnen im voraus für Ihr Verständnis.

Vorbereitung zur Coloskopie mit EZICLEN®

2 Tage vor der Untersuchung:

Erlaubt sind:

Weißbrot, Eier, Nudeln, Wurst, Frischkäse, Butter/Margarine, Käse, Eier, klare Fleischbrühe, klare Gemüsebrühe, Apfelsaft, (alle Sorten) Tee, Kaffee ohne Milch, stilles Mineralwasser.

Hierbei gibt es keine Mengenbeschränkung!

1 Tag vor der Untersuchung:

Frühstück:

1 Brötchen mit magerer Wurst, Käse, Frischkäse, gesüßter Tee oder Kaffee ohne Milch. Danach nichts mehr essen! Über den Tag verteilt mindestens 3 Liter Flüssigkeit trinken, wahlweise: stilles Mineralwasser, Apfelsaft, Tee (alle Sorten), klare Fleischbrühe.

Nach dem Frühstück sollten Sie keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen.

1. Dosis: Start um 16.00 Uhr:

Gießen Sie den Inhalt einer Flasche EZICLEN in den in der Packung enthaltenen Plastikbecher. Fügen Sie der Arznei kühles Wasser hinzu, bis die Markierung am Becher erreicht ist. Lassen Sie sich eine Stunde Zeit, um die gesamte Flüssigkeit zu trinken.

Wichtig:

Trinken Sie 2 weitere Becher mit Wasser, Tee oder Apfelsaft/- Schorle (stilles Mineralwasser) über die nächste Stunde verteilt.

Am Untersuchungstag:

2. Dosis (4 Stunden vor dem Termin)

Für die Einnahme der 2. Dosis gehen Sie bitte so vor, wie bereits am Vortag um 16.00 Uhr (siehe oben), trinken Sie anschließend noch mindestens 2 weitere Becher Wasser, Tee oder Apfelsaft/-Schorle.

Bitte trinken Sie anschließend so lange weiter bis Sie eine gelbliche, klare Flüssigkeit ausscheiden. Trinken können Sie Tee ohne Milch und stilles Mineralwasser.

Auch am Untersuchungstag ist das Trinken solange erlaubt, bis Sie gelblich – klare Flüssigkeit ausscheiden.

2 Stunden vor der Untersuchung nichts mehr trinken !!!

Bitte tragen Sie zur Untersuchung legere und lockere Kleidung!